

I D				外来・入院( 号)
氏 名				性別
生年 月日	年	月	日 ( 歳)	

第 ( ) クール

1クール21日

身長	cm	主治医	
体重	kg	腎機能	正常/異常
体表面積	m <sup>2</sup>	肝機能	正常/異常
SCr		CCr	mL/min

リツキサン 投与量(375mg/m<sup>2</sup>) = ( ) mg day1  
 エンドキサン 投与量(375mg/m<sup>2</sup>) = ( ) mg day1  
 アドリアシン 投与量(25mg/m<sup>2</sup>) = ( ) mg day1  
 オンコビン 投与量(0.7mg/m<sup>2</sup>) = ( ) mg day1  
 プレドニン 投与量(40~50mg/m<sup>2</sup>) = ( ) mg day1

サイン			
P r 調剤	P r mix	N s	医事

年 月 日 ( d a y 1 )	
中心静脈注射	無菌(閉鎖式器具使用)
外来化学療法加算	埋込型カテーテルによる中心静脈

**内服処方箋にて入力** day1日付 アセトアミノフェン錠200mg 2T 屯x(1)  
 イメンドカプセルセット 1セット 屯x(1)  
 ※コメントで「1日1カプセル3日間服用」と入力

開始前 内服	[ : ]	アセトアミノフェン錠200mg 2T			
①	[ : ]	ボトル① ・生食500mL 1袋	・化学療法施行中のルートキープ ・モニターをつける ・閉鎖ルートで開始		
②	[ : ]	ボトル② (20分) ・生食100mL 1本+ポララミン注5mg 1A+ハイドロコートン100mg 1V			
※ボトル③(リツキサン)の間は、ボトル①(ルートキープ用生食)を止める					
③	[ : ]	ボトル③ (□初回 : 50mL/hスタート 30分毎 50mL/hずつUP 最大400mL/hまで 計約3h) (□2回目以降 : 100mL/hスタート 30分毎100mL/hずつUP 最大400mL/hまで 計約2h) ・5%ブドウ糖液500mL 1本 ※リツキサンの9倍量を残して破棄。10倍希釈(1mg/mL)にする +リツキサン( )mg リツキサン100mg( )V リツキサン500mg( )V			
※ボトル①再開					
④	[ : ]	ボトル④ ・生食100mL + 水溶性プレドニン( )mg 30分 点滴 水溶性プレドニン 10mg ( )A			
⑤	[ : ]	ボトル⑤ ・パロノセトロン点滴静注バッグ 1袋 30分 点滴			
⑥	[ : ]	注射⑥ ・生食20mL + オンコビン ( )mg 1分かけて静注 オンコビン 1mg ( )V			
⑦	[ : ]	ボトル⑦ ・生食100mL + アドリアシン( )mg 全開で点滴 アドリアシン注用10 ( )V アドリアシン注用50 ( )V			
⑧	[ : ]	ボトル⑧ ・生食100mL + エンドキサン( )mg 30分 点滴 注射用エンドキサン100mg ( )V 注射用エンドキサン500mg ( )V			

年 月 日 ( d a y 2~5 )	
内服処方	プレドニン5mg錠 ( )錠 1日2回 朝昼食後 4日分
処方箋にて入力	

	検査データ	バイタル	副作用チェック	看護記録
月 日 (day)		前 中 後	悪心嘔吐 血管炎 排便状態 発熱、皮疹	サイン

## 投与基準 (休薬するとき)

○Grade3以上の血液毒性(白血球数 $<2000\sim1000/\mu\text{l}$ 、血小板数 $<50000\sim25000/\mu\text{l}$ )

○Grade3以上の非血液毒性

## 主な副作用

### リツキサン

○インフュージョンリアクション(発熱・悪寒・そう痒等): 投与開始24時間以内に頻発。

○腫瘍崩壊症候群: 初回投与後12~24時間以内に頻発、電解質の異常に注意。

○皮膚粘膜症: 1~13週目に頻発。⇒主治医に報告、皮膚科に相談。

○汎血球・赤血球・好中球・血小板減少症、無顆粒球症: 開始~8か月にみられた。

○感染症(敗血症、肺炎): 開始~3年の間も注意が必要。

○間質性肺炎: 開始~12週後までが頻発、また25週以降でも注意すること。

○B型肝炎ウイルスによる劇症肝炎・肝炎の増悪: 治療開始にHBV感染の有無を確認しておくこと。

### オンコビン

○悪心・嘔吐, 腹痛

○血管外漏出で静脈炎(壊死性)

### アドリアシン

○心筋障害、心不全(アドリアシン累積投与量 $500\text{mg}/\text{m}^2$ 以上または、LVEF $<50\%$ は慎重投与)

○口内炎

○血管外漏出で静脈炎(壊死性)

### エンドキサン

○出血性膀胱炎

○揮発性薬剤 閉鎖ルートを用いて溶解・投与。